



## Criterios diagnósticos de asma (modificado de 1-2)

Edad	Criterio	Validez	Condición
<b>0-23 meses</b>	Tres episodios de sibilancias de al menos 1 día de duración y que hayan afectado al sueño, con aceptable respuesta a tratamiento broncodilatador	Suficiente	
<b>2-5 años</b> (incluye niños mayores no colaboradores)	Tres episodios de sibilancias de al menos 1 día de duración y que hayan afectado al sueño, con aceptable respuesta a tratamiento broncodilatador	Suficiente	
<b>6-13 años</b>	Tres episodios de sibilancias de al menos 1 día de duración y que hayan afectado al sueño, con aceptable respuesta a tratamiento broncodilatador	Orientativo	
	Síntomas recurrentes o continuos relacionados con asma (tos crónica de predominio nocturno o matutino, pitos o disnea nocturna, fatiga o tos con el ejercicio físico, el frío o las emociones) en presencia de antecedentes personales o familiares de atopia	Orientativo*	Test de broncodilatación, variabilidad o de ejercicio positivos (al menos uno de ellos)**
	Síntomas con el ejercicio físico	Orientativo*	Test de ejercicio positivo**
	Un episodio de sibilancias con un test de broncodilatación positivo utilizando FEV1 para su determinación	Suficiente**	
* Precisa cumplir la condición			
** La negatividad del test no excluye el diagnóstico de asma			

1.-Díaz Vázquez C, Alonso Bernardo LM, García Muñoz T. Programa del Niño Asmático. Oviedo: Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional de la Salud. Gerencia de Atención Primaria de Oviedo; 1995.

2.-Carvajal I, García A, García M, Diaz C, Domínguez B. Plan Regional de Atención al Niño y Adolescente con Asma del Principado de Asturias. Servicio de Publicaciones del Gobierno del Principado de Asturias, 2002.